

foliQ[®]

SalWap B

Wysoko skoncentrowany, płynny nawóz azotowo-wapniowy z dodatkiem boru

FoliQ[®] SalWapB z uwagi na bardzo wysoką zawartość wapnia jest szczególnie polecany do nawożenia pozakorzeniowego oraz fertygacji upraw ogrodniczych i rolniczych podatnych na choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem wapnia.

Składniki odżywcze zawarte w FoliQ[®] SalWapB są bardzo dobrze rozpuszczalne, dzięki czemu mogą być łatwo i szybko absorbowane przez rośliny.


MAKROELEMENTY

| | |
|------------|-----|
| Azot (N) | g/l |
| Wapń (CaO) | 119 |
| | 220 |

MIKROELEMENTY

| | |
|---------|-----|
| Bor (B) | g/l |
| | 5 |

Gęstość 1,43 kg/l, pH 6,0 - 7,0



foliQ[®]

SalWap B

119 g/l N + 220 g/l CaO + 5 g/l B

NAOŻENIE INTERWENCYJNE

N

NAWÓZ MAKROELEMENTOWY

Agrii Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233
60-650 Poznań
tel. 61 8429466



NAWÓZ PŁYNNY



Kluczowe zalety

- wysoka zawartość kluczowych składników pokarmowych
- skład uzupełniony o bor
- doskonała rozpuszczalność nawozu
- bardzo dobra mieszalność z innymi agrochemikaliami
- doskonałe parametry cieczy roboczej
- wysokie bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

Najważniejsze korzyści

- optymalne zaopatrzenie roślin w wapń i azot
- stymulowanie wzrostu systemu korzeniowego
- zrównoważony rozwój części nadziemnej roślin
- wyższa odporność na stres związany z wysokimi temperaturami
- ograniczenie chorób fizjologicznych spowodowanych niedoborem wapnia
- wyższa odporność na choroby
- zapobieganie pękaniu owoców
- wysoki plon o dobrej jakości
- wysoka zdolność przechowalnicza owoców

Dawki i terminy stosowania

| Uprawa | Dawka l/ha | Liczba zabiegów i terminy stosowania |
|-------------------------|------------|---|
| Drzewa owocowe | 2 - 5 | 4 - 8 zabiegów: od opadania płatków kwiatowych do zbiorów owoców; wyższa liczba zabiegów jest rekomendowana w przypadku podatności na choroby fizjologiczne powodowane niedoborem wapnia, np. gorzka plamistość podskórna |
| Jagodowe | 2 - 3 | 2 - 3 zabiegi: od wykształcenia zawiązków do zbiorów |
| Pomidor, papryka | 3 - 4 | 2 - 3 zabiegi: od zawiązywania owoców |
| Warzywa kapustne | 3 - 4 | 3 - 4 zabiegi: od fazy zawiązywania główek/róż |
| Pozostałe uprawy polowe | 2 - 4 | 2 - 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym |

Uwaga! Nie mieszać z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.